


دانشگاه علوم پزشکی بم

بیمارستان آیت الله هاشمی (فسنجانی)

آپاندکتومی (برداشتن آپاندیس به

روش جراحی)



EDU-GUD-01

6- بعد از ترخیص از بلند کردن اجسام سنگین پرهیزید و فعالیت طبیعی بین معمولاً 2 تا 4 هفته بعد از عمل از سرگرفته میشود.

7- تشویق به زود راه افتادن بعد از عمل به پیشگیری از ایجاد لخته در وریدهای پا کمک میکند

8- بعد از ترخیص محل زخم از نظر عفونت و قرمزی و التهاب بررسی شود و در صورت داشتن این علائم سریعاً به پزشک مراجعه نمایید.

9- داروهای تجویز شده در منزل طبق دستور پزشک مصرف شود.

10- بعد از ترخیص جهت مشاهده و بررسی محل جراحی و برداشتن بخیه ها به پزشک مراجعه کند

منبع : برونر سودارت - داخل، جراحی
ویرایش چهاردهم - گوارش 2018

**مراقبتهای بعد از عمل(خود)

مراقبتی در منزل

1- به منظور کاهش فشار بر محل جراحی و همینطور کاهش درد بیمار در وضعیت نیمه نشسته قرار گیرد. ریه ها در این وضعیت بهتر منبسط شده و تنفس راحت تر صورت میگیرد.

2- پانسمان ناحیه عمل خشک نگه داشته شود و طبق دستور پزشک پانسمان تعویض شده و در 72 زمان معین شده توسط پزشک برای کشیدن بخیه ها مراجعه نماید.

3- پس از عمل و بهبودی آمدن داروهای مسکن و آنتی بیوتیک طبق دستور پزشک داده خواهد شد

4- شروع رژیم غذایی برای بیمار طبق دستور در صورت تحمل مایعات بصورت خوراکی داده میشود

5- بعد از ترخیص در باره نحوه مراقبت از محل جراحی تعویض پانسمان و شستشوی زخم آموزش داده شود

دیس زائده ای کوچک وکرمی شکل
ولی حدود 8 تا 10 سانتیمتر است که به
ده متصل شده است و بطور مرتب با غذا
و خالی میشود و از آنجایی که مجرای آن
چک است ممکن است بخوبی تخلیه
نشد و لذا مستعد انسداد و عفونت است .
دیسیت شایع ترین علت جراحی
ژانسی شکمی و شایعترین علت درد حاد
م در امریکا است . در هر سنی ممکن
ت رخ دهد ولی بیشتر بین سنین 10 تا 30
گی شایعتر است وقوع آن در مردان
تر است و یک استعداد خانوادگی در بروز
نقش دارد.

آپاندیس به علت پیچ خوردگی یا انسداد یا در
موارد نادر بعلت جسم خارجی (دانه میوه)
یا تومور دچار التهاب و ادم میشود

****علائم بالینی آپاندیسیت :**

دردی مبهم در ناحیه سردل یا اطراف ناف
وجود دارد که بتدریج به قسمت پایین
و راست شکم منتقل میشود (دردی تیز
و مشخص و موضعی) معمولا با تب خفیف
و تهوع و در 50% موارد با استفراغ همراه
است . کاهش اشتها شایع است اگر آپاندیس
پاره شود درد منتشر و باعث عفونت شکم
میشود و نفخ شکم ایجاد میشود و وضعیت
بیمار وخیم میگردد . بیوست هم ممکن است
در آپاندیسیت حاد ایجاد گردد. در صورت
مصرف ملین آپاندیس ملتهب ممکن است
پاره شود. پس بطور کلی در صورتیکه بیمار

دچار تب و تهوع یا درد شکم است از دارو
ملین یا مسهل نباید استفاده کرد

****آپاندکتومی (برداشتن آپاندیس**

روش جراحی) هرچه سریعتر برای کاهش
خطر سوراخ شدن احتمالی انجام میشود بیش
تحت بیهوشی عمومی وبا ایجاد یک بر
در قسمت
پایین شکم ویا از طریق انجام لاپاراسکوپی
نوع جراحی صورت میگیرد

****مراقبتهای قبل عمل :**

*تاوقت عمل در تخت یا صندلی استراحت کند
*از خوردن و آشامیدن پرهیزد تا معده خالی
باشد . زمانیکه معده خالی باشد بیهوشی پس
بیخطر خواهد بود .
*از داروهای ملین و مسهل وکیف آبگ
استفاده نکند.
