


دیلاتاسیون و کورتاژ



EDU-GUD-01

پمفلت آموزش مددجو



1. تب
2. ترشحات زیاد و غیرطبیعی
3. درد زیاد در قسمت زیر شکم
4. افزایش خونریزی
5. ترشحات بدبو
6. هر نوع حالت غیرطبیعی مثل سردی، ضعف، بیحالی، تب و غیره.

توجه داشته باشید عمل دیلاتاسیون و کورتاژ هیچ تاثیری در روند زندگی شما ندارد و می توانید بعد از یک هفته استراحت بدون هیچ مشکلی زندگی عادی خود را از سر بگیرید.



در صورتیکه عمل شما برای خارج کردن بقایای حاملگی انجام شده، در صورت تمایل به بارداری مجدد لازم است حاملگی خود را تا 6 ماه به تاخیر اندازید تا رحم شما آمادگی لازم را پیدا کند و تصمیمگیری برای بارداری مجدد حتماً تحت نظر پزشک متخصص زنان انجام شود. ممکن است بارداری مجدد حتی دو هفته بعد از سقط انجام گیرد. برای جلوگیری از آن لازم است با پزشک خود مشورت نموده و روش مناسب و مطمئنی را برای جلوگیری از بارداری انتخاب نمایید.

بعد از کورتاژ لازم است، قرصهای آهن تجویز شده توسط پزشک را به مدت 3 ماه برای جبران کم خونی خود استفاده نمایید.

در موارد زیر لازم است به پزشک خود مراجعه نمایید:


دیلاتاسیون و کورتاژ؟

کردن دهانه‌ی رحم و تخلیه‌ی نسج آن را
ی‌ند. این عمل یکی از شایع‌ترین عمل‌های زنان
ست،

تواند برای تشخیص یا درمان خونریزی‌های
غیرطبیعی زنان به‌کار رود.

خونریزی غیر طبیعی از واژن چیست؟

شرایط مختلف یک زن ممکن است مشکلاتی
شته باشد که منجر به خونریزی غیرطبیعی از
زن گردد. خونریزی غیرطبیعی به خونریزی
ته می‌شود که در زمانی خارج از انتظار ما
باق بیافتد.



1

موارد خونریزی غیر طبیعی واژن

1. بعد از تماس جنسی.
2. هنگام یائسگی یا بعد از آن.
3. در بین دو دوره‌ی قاعدگی به صورت لکه
بینی.
4. ترشح خونی از واژن یا خونریزی در نیمه‌ی
اول حاملگی.




عمل دیلاتاسیون و کورتاژ ضمن بیهوشی
عمومی یا بیحسی ناحیه‌ای، بعد از اینکه شما را
در وضعیت مناسبی قرار دادند که دسترسی به
رحم آسان باشد، انجام می‌شود.



ابتدا دهانه‌ی رحم را متسع (باز) میکنند: در
صورتی‌که علت خونریزی سقط است، محصولات

2

حاملگی را خارج مینمایند و اگر علت خونریزی
نامعلوم است از بافت رحم نمونه (بیوپسی)
برمی‌دارند.



اگر پزشک شما ناحیه‌ی مشکوکی را یافت، او
ممکن است یک بخش یا همگی آن را خارج کند
و به آزمایشگاه بفرستد. یک آسیب‌شناس بافت
را زیر میکروسکوپ آزمایش میکند، تا سرطان
یا دیگر بیماری‌های احتمالی را تشخیص دهد.



مراقبت‌های بعد از عمل:

قبل از موارد زیر حتماً با پزشک خود مشورت

کنید:

1. انجام کارهای سنگین بعد از عمل جراحی.
2. داشتن تماس جنسی بعد از عمل جراحی.

3